SHUTTERSTOCK

ΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ο κ. **Αλέξανδρος Συρρής,** κτηνίατρος και διευθυντής των σταθμών συλλογής γάλακτος της ΔΕΛΤΑ, μας μιλάει για τα ψυχανθή και το πώς εντάχθηκαν στα σιτηρέσια της εταιρείας.

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ: «Ηρθε ο καιρός να επανέλθουμε στον παραδοσιακό τρόπο διατροφής των ζώων...» μας αναφέρει ο κ. Συρρής, μια και η «ασταθής» πλέον σόγια δεν επιτρέπει τον μακρόχρονο σχεδιασμό για μια επιχείρηση. «Δυστυχώς, αυτές οι καλλιέργειες χάθηκαν στο χρόνο μετά την εδραίωση της σόγιας στην αγορά, αλλά τα οφέλη τους είναι πολλαπλά». Από πέρυσι, η εταιρεία «ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα Α.Ε.» βάζει σε εφαρμογή το «**σχέδιο δράσης ΓΑΙΑ**», το οποίο περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις, όπως:

- **Ημερίδες** ανά την Ελλάδα ενημέρωσης των κτηνοτρόφων και των παραγωγών της εταιρείας -και όχι μόνο- για την καλλιέργεια των ψυχανθών, την ορθή διαχείρισή τους και τους ποικίλους τρόπους ενσωμάτωσης στις ζωοτροφές.
- **Τεχνογνωσία** σε κτηνοτρόφους, με λεπτομερή σιτηρέσια πλήρως απαλλαγμένα από σόγια (π.χ. για αγελάδες μ.β. 600 κιλών, με μέση παραγωγή γάλακτος 30 κιλά την ημέρα).
- **Καλλιέργειες 10.000 στρ.,** το χειμώνα που πέρασε, ψυχανθών και συγκαλλιέργειες αυτών με χειμερινά σιτηρά.
- **Πειράματα** σε πραγματικές συνθήκες στον αγρό και στους στάβλους σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την επιστημονική τεκμηρίωση του αν όντως η αντικατάσταση της σόγιας είναι εφικτή, χωρίς τη μείωση των αποδόσεων των ζώων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οπως μας επιβεβαιώνει και ο κ. Συρρής, τα αποτελέσματα της 1ης πιλοτικής καλλιέργειας του χειμώνα 2012-2013 είναι θετικά και επαναλήψιμα. Σε αγρόκτημα του ΓΠΑ, με επικεφαλής τους καθηγητές Γ. Ζέρβα και Ι. Χατζηγεωργίου, συγκαλλιεργήθηκαν βίκος με κριθάρι και η παραγωγή του σανού τους αντικατέστησε μέρος της σόγιας και του αραβοσίτου στα σιτηρέσια αγελάδων. Τα επιστημονικά δεδομένα έδειξαν ότι ο **βίκος και το κριθάρι επιτρέπουν τη μερική ή ολική αντικατάσταση του σογιάλευρου στο σιτηρέσιο, χωρίς να επηρεαστεί η παραγόμενη ποσότητα γάλακτος και η χημική του σύσταση.** Εξοικονόμησαν 1,85 κιλά σογιάλευρου ανά ημέρα και ανά αγελάδα, χωρίς καμία δυσμενή επίδραση επί της υγείας και της παραγωγικότητας των ζώων. Επιπλέον, οι αγελάδες που παράγουν από 10 έως και 25 κιλά γάλακτος δεν χρειάζεται καν να τραφούν με σόγια, αλλά μπορούν να λάβουν την απαραίτητη πρωτεΐνη από χειμερινά κτηνοτροφικά ψυχανθή.

> **Απεδείχθη ότι η αντικατάσταση της σόγιας είναι εφικτή και συμφέρουσα, χωρίς τη μείωση των αποδόσεων των ζώων.**

Η επόμενη μέρα

«Πλέον η χρήση της σόγιας γίνεται αποτρεπτική και θα πρέπει να δείξουμε το δρόμο. Αν δημιουργηθεί η ζήτηση για τα προϊόντα που ήταν κάποτε αξιόλογα και χάθηκαν, θα αυξηθεί και η προσφορά», μας λέει ο κ. Συρρής. «Ετοιμαζόμαστε σε ένα μήνα για τις επόμενες πιλοτικές σπορές με μπιζέλι και κριθάρι, ενώ θα καλλιεργηθούν φέτος από παραγωγούς μας πάνω από 15.000 στρέμματα με χειμερινά ψυχανθή.